

Qui puis-je appeler

Toute question peut être posée :
chacun s'est engagé à vous
apporter la réponse la plus précise
et la plus adaptée à vous...

Mon
traitement
par



Scélrose en Plaques & Maladie de Parkinson
Région Hauts-de-France

Infirmièr(e) Référent(e) "SEP" :

.....

Hôpital de jour :

.....

Mon neurologue :

.....

Mon médecin traitant :

.....

Mon pharmacien :

.....



Scélrose en Plaques & Maladie de Parkinson
Région Hauts-de-France

Réalisation septembre 2020 :

Réseau PARC SeP :
03 20 49 04 04
secretariat@parcsep.fr

Site internet : www.parcsep.fr

Réalisation : www.creafec.com - Ocrevus_2020-09

Ocrevus®

Ocrelizumab




Guide patient

Qu'est-ce que **Ocrevus®** ?

Comment agit-il ?

OCREVUS® (ocrelizumab) est un anticorps monoclonal qui cible spécifiquement un marqueur appelé CD20 se trouvant à la surface des lymphocytes B spécifiques.

Les lymphocytes B sont un type de globules blancs faisant partie du système immunitaire qui jouent un rôle dans la SEP.



- **OCREVUS® cible et élimine ces lymphocytes B spécifiques, ce qui :**
 - réduit l'inflammation et la dégradation de la gaine de myéline,
 - réduit le risque d'avoir une poussée,
 - ralentit la progression de votre maladie.

Quelles indications ?

Retenues à ce jour et financées pour la France

- **OCREVUS® est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de formes actives de SEP-R définies par des paramètres cliniques ou d'imagerie. C'est un traitement de 1ère et 2ème intention dans toutes les formes actives de SEP récurrente (SEP RR ou SEP SP avec poussées)**

Quelles contre-indications ?

- Hypersensibilité à l'Ocrevus® ou à l'un des excipients
- Infection active en cours
- Déficit immunitaire sévère
- Affections malignes évolutives connues

Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser OCREVUS® ?

Ocrevus® et les autres médicaments :

Si vous prenez, ou avez récemment pris, ou pourriez prendre tout autre médicament, en particulier :

- Des médicaments qui affectent le **système immunitaire** tels que chimiothérapie, immuno-suppresseurs ou autres médicaments pour traiter la SEP



- Des médicaments contre l'**hypertension artérielle**.



Il est recommandé d'**arrêter de prendre vos médicaments contre l'hypertension artérielle pendant 12 heures avant la perfusion d'OCREVUS®**

Quelle **surveillance ?****

A réaliser avant l'instauration d 'OCREVUS®

**Indispensable
pour débuter votre traitement**

• **Bilan pré-thérapeutique****



1 - Biologique et radiologique (bilan de moins de 3 mois)

- NFS Plaquettes – (**phénotypage Lymphocytes B et T)
- Urée, créatinine, DFG (débit de filtration glomérulaire)
- TGO - TGP
- CRP
- Immunoélectrophorèse des protéines plasmatiques
- Dosage pondéral des immuno-globulines
- Sérologie VHB, VHC, VIH
- Sérologie VZV
- BétaHCG (pour les femmes en âge de procréer)

Date : / /.....

Vérifier si présence d'un éventuel traitement anti-hypertenseur

Radiographie du thorax **Date :** / /.....

IRM cérébrale de moins de 3 mois **Date :** / /.....

** Recommandations préconisées au niveau régional par les Centres Experts SEP des CHU / GHICL de Lille et CHU d'Amiens.

Par ailleurs, votre neurologue qui vous connaît bien pourra le compléter.

Quelle **surveillance ?****

A réaliser avant l'instauration d 'OCREVUS®

• **Bilan pré-thérapeutique****



2 - Recommandations vaccinations

Il est recommandé de mettre à jour votre calendrier vaccinal, sauf contre-indications spécifiques.

- IDR et/ou Quantiféron*
- DTP : Date : / /.....
- Coqueluche
- Hépatite B
- ROR (selon données du calendrier vaccinal, pas de revaccination, ni de dosage d'anticorps)
- VZV*
- Pneumocoque : à réaliser si vous n'avez jamais été vacciné
- Prevenar 13 : **Date :** / /.....
- Pneumovax (6 à 8 semaines après le Prévenar 13, possible après le début du traitement à 4 mois après J1 de la 1^{ère} cure d'Ocrevus) : **Date :** / /.....
- Vaccination anti-grippale saisonnière

*Vaccins vivants atténués contre-indiqués en cas d'immunosuppression

**Recommandations préconisées au niveau régional par les Centres Experts SEP des CHU / GHICL de Lille et CHU d'Amiens

Par ailleurs, votre neurologue qui vous connaît bien pourra le compléter.

Quelle surveillance ?

• Avant chaque dose, toujours vérifier :

- Toute contre-indication à l'Ocrevus®

48h avant.

- NFS-plaquettes Leucocytes
- Lymphocytes
- Immuno-phénotypage lymphocytaire
- Dosage pondéral des immunoglobulines (Ig G / Ig M / Ig A)

- IRM annuelle



• Avant chaque perfusion :

antihistaminique
+/-Antipyrétique
(ex paracétamol)



30 - 60 minutes

Environ avant
chaque perfusion
d'OCREVUS®

methylprednisolone
100 mg par voie IV
ou équivalent



30 minutes

Environ avant
chaque perfusion
d'OCREVUS®




**Ne pas prendre son anti-hypertenseur
le jour de l'administration**

Comment OCREVUS® est-il administré ?

En hôpital de jour, OCREVUS® est un traitement qui s'administre, sur la journée, **exclusivement à l'hôpital**.

- 2 perfusions distinctes espacées de 2 semaines
- 1 perfusion intraveineuse tous les 6 mois en milieu hospitalier

Schéma d'administration et doses



La dose initiale de 600 mg est administrée en 2 perfusions distinctes de 300 mg espacées de 2 semaines.

La 1^{re} des doses suivantes de 600 mg doit être administrée 6 mois après la première perfusion de la dose initiale. Un intervalle minimal de 5 mois doit être maintenu entre chaque dose d'OCREVUS®.

Pour les femmes en âge de procréer



- Contraception efficace pendant le traitement et durant les 12 mois suivant la dernière perfusion
- Grossesse et allaitement : OCREVUS® doit être évité

Quels effets secondaires ?

1. Réactions à la perfusion (RAP)

C'est l'effet indésirable le plus fréquent pouvant survenir avec ce traitement (1 personne / 10). Dans la majorité des cas, ces réactions sont légères mais certaines réactions plus sérieuses peuvent se produire.

Une RAP peut se produire pendant et jusqu'à 24 heures après la perfusion. Il est important d'informer immédiatement votre médecin ou votre infirmier(ère) si vous présentez tout signe ou symptôme (liste non exhaustive) :



Cutanées

- Démangeaisons cutanées
- Éruption cutanée
- Urticaire
- Rougeur de la peau

Allergiques

- Irritation ou douleur de la gorge
- Essoufflement
- Gonflement de la gorge
- Hypotension

Autres

- Bouffées vasomotrices
- Fièvre
- Sensation de fatigue
- Céphalées
- Etourdissements
- Nausées
- Battements cardiaques rapides

2. Réactions liées au traitement : infections le plus souvent



Vous êtes plus vulnérable aux infections sous OCREVUS®

Infections très fréquentes (≥ 1 patient /10)

- Infections des voies respiratoires supérieures et grippe

Infections fréquentes (≥ à 1 patient /100) (< à 1 patient /10)

- Infection des sinus
- Bronchite
- Infection herpétique (bouton de fièvre ou zona)
- Gastro-entérite
- Infection des voies respiratoires
- Infection virale
- Infection de la peau (cellulite)

Certaines de ces infections peuvent être graves. Prévenir votre médecin.

